

# ANTIBIOTHÉRAPIE INTRAVEINEUSE À DOMICILE

## Conseils d'usage

### AU DÉBUT DE VOTRE TRAITEMENT

La pharmacie de l'hôpital vous fournira votre antibiotique et le matériel nécessaire pour les premières 24 à 48 heures de votre traitement à domicile.

Par la suite, votre pharmacie communautaire prendra la relève pour la poursuite de votre traitement. Vous devrez aller chercher vous-même votre antibiotique et le matériel requis à la pharmacie (à moins d'entente de livraison avec celle-ci).

La majorité des antibiotiques sont couverts par le Régime d'assurance maladie du Québec (RAMQ) ou par votre assurance privée.

### CONSERVATION DE VOTRE ANTIBIOTIQUE

- L'antibiotique est contenu dans une seringue ou dans un sac.
- La majorité des antibiotiques doivent être conservés au réfrigérateur :
  - les conserver au réfrigérateur avec la solution saline (s'il y a lieu);
  - les placer dans un contenant hermétique afin d'éviter la contamination avec les autres aliments;
  - les sortir du réfrigérateur avant la prochaine heure d'administration prévue :
    - seringue : 30 à 60 minutes,
    - infuseur/perfuseur : 3 h,
    - sac : 60 minutes.

**Ne jamais utiliser un four à micro-ondes ou de l'eau chaude pour réchauffer votre antibiotique.**

### LE CATHÉTER ET LE PANSEMENT

- Éviter de tirer sur le cathéter ou sur la tubulure.
- Il est déconseillé de tirer ou de frotter la peau près du pansement.
- Laisser le pansement du cathéter en place.
- Remettre à plus tard tous travaux nécessitant des ciseaux ou des objets coupants près de la tubulure.
- Éloigner la tubulure de toute source de chaleur.
- Les mouvements brusques risquant de déplacer ou briser le cathéter (ex. sport de contact) sont déconseillés.
- Éviter tout contact avec votre animal, s'il y a lieu.
- S'assurer que la rallonge est bien fixée.
- S'assurer que la tubulure est bien fixée à l'aide du diachylon, afin de prévenir un déplacement accidentel du cathéter. Au besoin, refixer la tubulure à l'aide du diachylon.
- Prendre un bain plutôt qu'une douche afin d'éviter de mouiller le site d'insertion du cathéter. Lors du bain :
  - recouvrir le cathéter d'une pellicule de plastique de style « Saran Wrap » et fixer les extrémités avec du diachylon : il est très important de ne pas mouiller le pansement;
  - même avec ces précautions, ne pas tremper votre bras dans l'eau du bain.

## **ÉLÉMENTS DE SURVEILLANCE**

### **CATHÉTER**

S'assurer que le cathéter est intact, qu'il n'est pas déplacé, ni coupé ou brisé et qu'il n'y a pas de fuite de liquide.

### **SITE D'INSERTION**

Le site d'insertion est l'endroit où le cathéter intraveineux est inséré dans la peau. Il peut être à risque d'infection. Il ne doit pas y avoir de rougeur, de chaleur, de gonflement, de sensibilité, présence de pus ou d'écoulement au site du cathéter.

### **PANSEMENT**

Le pansement doit être propre, sec et étanche en tout temps.

### **PRISE DE LA TEMPÉRATURE**

Vous devez prendre votre température par la bouche :

- À tous les matins, à votre réveil.
- À tous les soirs, au coucher.

Comment prendre la température ?

- Attendre au minimum 20 minutes après avoir mangé, mâché de la gomme, bu ou fumé pour prendre la température.
- Glisser le thermomètre sous la langue, le laisser en place au moins trois minutes ou jusqu'au signal sonore.
  - Si le thermomètre indique plus de 38 °C (100,4 °F), suivez les recommandations indiquées dans le tableau des complications possibles ci-après;
  - Chez l'adulte, la température buccale varie habituellement entre 36 °C et 37,7 °C (96,8 °F à 99,9 °F).

### **DIRECTIVES EN CAS DE COMPLICATIONS**

Si vous avez des questions ou des inquiétudes, veuillez consulter les recommandations à prendre en cas de complications possibles (voir tableau ci-après).

## TABLEAU DES COMPLICATIONS POSSIBLES

COMPLICATIONS	SIGNES ET SYMPTÔMES	RECOMMANDATIONS
<b>Infiltration</b> (Le médicament s'écoule hors de la veine sous la peau)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gonflement autour du cathéter.</li> <li>• Gonflement du bras.</li> <li>• Peau froide autour du cathéter.</li> <li>• Sensation de brûlure ou de douleur lors de l'injection.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermer la pince-tube de la tubulure de rallonge du cathéter.</li> <li>• Contacter le personnel infirmier du CLSC.</li> <li>• Appliquer une serviette humide chaude sur le pansement.</li> </ul>
<b>Thrombophlébite</b> (Veine irritée)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensation de cordon dur le long de la veine où est inséré le cathéter.</li> <li>• Rougeur.</li> <li>• Sensibilité.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contacter le personnel infirmier du CLSC.</li> </ul>
<b>Infection</b> au site d'insertion du cathéter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gonflement.</li> <li>• Sensibilité.</li> <li>• Rougeur.</li> <li>• Présence de pus ou d'écoulement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contacter le personnel infirmier du CLSC.</li> </ul>
<b>Aggravation de l'infection</b> pour laquelle vous êtes traité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Température buccale élevée à plus de 38 °C (100,4 °F).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reprendre la température buccale 4 h plus tard. Si vous êtes encore à 38 °C (100,4 °F) ou plus, contacter le personnel infirmier du CLSC.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Température buccale élevée à plus de 38,5 °C (101,3 °F).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contacter le personnel infirmier du CLSC.</li> </ul>
<b>Pansement humide, décollé ou souillé</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Présence de sang ou de liquide sur le pansement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contacter le personnel infirmier du CLSC.</li> </ul>
<b>Déplacement du cathéter</b> – cathéter intraveineux périphérique court	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le cathéter est entièrement ou partiellement sorti de la veine.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si le cathéter est entièrement sorti</b> : appliquer un pansement ou une ouate sur le site jusqu'à ce que le saignement s'arrête.</li> <li>• <b>S'il est partiellement sorti</b> : arrêter la perfusion et contacter le personnel infirmier du CLSC.</li> </ul>
<b>Déplacement du cathéter</b> – cathéter central introduit par voie périphérique Ex : Picc-Line	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensation de douleur à l'oreille, au cou ou à l'épaule du côté du cathéter.</li> <li>• Enflure au niveau du cou.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contacter le personnel infirmier du CLSC.</li> </ul>

COMPLICATIONS	SIGNES ET SYMPTÔMES	RECOMMANDATIONS
<b>Occlusion du cathéter</b> (cathéter bouché)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une résistance se produit au moment d'administrer l'antibiotique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer que la pince-tube de la tubulure de rallonge du cathéter est ouverte.</li> <li>• S'assurer que la tubulure est bien vissée.</li> <li>• S'assurer que le bras est allongé.</li> <li>• Tenter à nouveau d'administrer l'antibiotique.</li> <li>• Si la résistance se poursuit, fermer la pince-tube de la tubulure de rallonge du cathéter.</li> <li>• Contacter le personnel infirmier du CLSC.</li> </ul>
<b>Bris du cathéter</b> (cathéter coupé ou brisé)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Au moment d'administrer l'antibiotique, du sang ou du liquide s'écoule par l'extrémité coupée ou brisée du cathéter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermer la pince-tube de la tubulure de rallonge du cathéter.</li> <li>• Contacter le personnel infirmier du CLSC.</li> </ul>

## RESSOURCES

Des capsules vidéo explicatives pour l'antibiothérapie intraveineuse à domicile se trouvent dans la section « Autosoins à domicile | Thérapie intraveineuse » du site Web [santeestrie.qc.ca](http://santeestrie.qc.ca).

Pour tout problème non indiqué dans le tableau des complications possibles, référez-vous à :



Votre CLSC.



Info-Santé en composant le 8-1-1.



L'urgence du centre hospitalier le plus près de votre domicile.

### Auteurs

L'équipe de l'unité de médecine de jour (Direction des soins spécialisés, chirurgicaux et de cancérologie)  
Direction des soins infirmiers (DSI)

### Révision et mise en page

Service des communications et des relations médias  
Présidence-direction générale

© Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2024

[santeestrie.qc.ca](http://santeestrie.qc.ca)

Avril 2024 – 4-6-12040 (version français) | 4-6-12041 (version anglaise)