

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

GOUTTELETTES/CONTACT

PRÉCAUTIONS pour le **PERSONNEL** et les **VISITEURS**
WARNING to STAFF and VISITORS



Hygiène des mains : à l'entrée
: à la sortie de la chambre
SI GASTROENTÉRITE : eau/savon à la sortie de la chambre



Masque de procédure



Blouse à manches longues



Gants



Matériel dédié
ou **désinfecté après usage**



Confinement
de l'utilisateur dans la chambre

PRÉCAUTIONS à appliquer
par **L'USAGER** avant
de **SORTIR** de la **CHAMBRE**



PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

GOUTTELETTES/CONTACT

ADULTE/ENFANT

INDICATIONS

ADULTE

- Gastroentérite virale (GEV)
- Infections des voies respiratoires inférieures chez un usager porteur de bactéries multirésistantes (SARM, SARM-AC, BGNMR, BGNPC/EPC)
- Infection invasive à streptocoque du groupe A (SGA) jusqu'à 24 h après le début de l'antibiothérapie appropriée (ex. : méningite, pneumonie, fasciite nécrosante et choc toxique streptococcique)
- Infection invasive à streptocoque du groupe A (SGA) jusqu'à 24 h après le début de l'antibiothérapie appropriée (ex. : méningite, pneumonie, fasciite nécrosante et choc toxique streptococcique)
- *Pneumocystis jirovecii* (PCP)

ENFANT

- Gastroentérite virale (GEV)
- Syndrome d'allure grippale (SAG), influenza et autres virus respiratoires
- Infections des voies respiratoires inférieures chez un usager porteur de bactéries multirésistantes (SARM, SARM-AC, BGNMR, BGNPC/EPC)
- Infection invasive à streptocoque du groupe A (SGA) jusqu'à 24 h après le début de l'antibiothérapie appropriée (ex. : méningite, pneumonie, fasciite nécrosante et choc toxique streptococcique)
- Pharyngite à SGA, scarlatine (jusqu'à 24 h après le début de l'antibiothérapie appropriée)
- Infections invasives à *N. meningitidis* (méningite, méningococcémie) jusqu'à 24 h suivant le début de l'antibiothérapie appropriée
- Rubéole congénitale
- Contact non immun d'un cas de rubéole au stade contagieux de la maladie
- *Pneumocystis jirovecii* (PCP)

Hygiène des mains

- En présence d'un cas suspect ou confirmé de gastroentérite virale, prioriser l'hygiène des mains avec de l'eau et du savon au lieu d'une solution hydroalcoolique (SHA)

Hygiène et salubrité

- Désinfection « contact »
 - Au transfert ou au départ de l'utilisateur
 - À la fin des précautions additionnelles même si l'utilisateur demeure dans sa chambre

- Affiche « GOUTTELETTES/CONTACT »
- Support pour sacs à linge et déchets
- Blouse à manches longues
- Masque de procédure
- Gants
- Lingettes désinfectantes
- Matériel dédié (thermomètre, stéthoscope, brassard, chaise bassine, etc.)

Matériel requis pour l'application des précautions

Service de prévention et contrôle des infections | Décembre 2018