

## ORDONNANCE COLLECTIVE

<b>Ordonnance collective :</b> Administration de la médication préopératoire pour une chirurgie ophtalmique.	<b>Numéro</b> Ophtalmologie-01
---	-----------------------------------

<b>DESCRIPTION :</b> Administrer la médication préopératoire pour les chirurgies de cataracte, de vitrectomie ou d'encerclement scléral.	<b>DATE DE MISE EN VIGUEUR :</b> JANVIER 2008	<b>DATE DE RÉVISION :</b> JANVIER 2011
<b>TITRE DU PROTOCOLE :</b> Administrer la médication préopératoire pour une chirurgie ophtalmique.		
<b>ACTIVITÉS RÉSERVÉES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.</li> <li>- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance.</li> </ul>		
<b>PROFESSIONNELS HABILITÉS À EXÉCUTER L'ORDONNANCE :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infirmières et infirmiers pour l'évaluation initiale et l'administration de la médication préopératoire travaillant en chirurgie d'un jour et les unités de soins médecine, chirurgie et santé mentale au CHUS – Hôtel-Dieu.</li> <li>- Infirmières auxiliaires et infirmiers auxiliaires pour l'administration de la médication préopératoire suite à l'évaluation initiale et l'autorisation de l'infirmière ou l'infirmier travaillant en chirurgie d'un jour et les unités de soins médecine et chirurgie au CHUS – Hôtel-Dieu.</li> </ul>		

### INDICATIONS ET CONDITIONS D'INITIATION :

- Usager devant subir une chirurgie de cataracte, de vitrectomie ou d'encerclement scléral.
- Usager ne présentant aucun signe clinique d'infection observable (ex. : rougeur, écoulement, douleur, température).

### CONTRE-INDICATIONS/LIMITES :

- Ne pas administrer le Lorazépam (Ativan<sup>md</sup>) si :
  - usager âgé de plus de 85 ans;
  - usager présentant une altération de l'état mental (confusion, délire, hallucinations, etc.);
  - ordonnance médicale à cet effet.

Note : Si usager âgé entre 70 et 85 ans et/ou si poids corporel actuel inférieur à 45 kg, diminuer la dose de Lorazépam (Ativan<sup>md</sup>) (voir au point 2).

### INTENTION THÉRAPEUTIQUE OU BUT VISÉ :

- Diminuer l'anxiété de l'usager.
- Dilater la pupille et prévenir l'infection postopératoire.

**Ordonnance collective :**

Administration de la médication préopératoire pour une chirurgie ophtalmique.

**Numéro**

Ophtalmologie-01

**PROTOCOLE :**
**TITRE:** Administrer la médication préopératoire pour une chirurgie ophtalmique.

**Séquences :**

Administrer la médication préopératoire suivante selon la technique de soins infirmiers n° 13T5.

1. Vérifier si le patient présente des **allergies** à des médicaments.

Plusieurs patients présentent des allergies médicamenteuses. Notons également que les médicaments oculaires contiennent souvent des agents de conservation; certaines personnes peuvent être allergiques à ces produits. On doit être à l'affût de cette éventualité, même si la personne a déjà reçu la médication sans présenter d'allergie. Si le patient a des allergies médicamenteuse, toujours vérifier avec le pharmacien si ces allergies sont une contre-indication à administrer les médicaments inclus dans ce protocole.

2. Lorazépam (Ativan<sup>md</sup>), 1 mg S/L, 1 heure préopératoire.

Ne pas donner le Lorazépam si le patient est confus, âgé de plus de 85 ans ou si ordonnance médicale à cet effet. Si usager âgé entre 70 et 85 ans **ou** si son poids corporel actuel est inférieur à 45 kg, diminuer la dose de Lorazépam (Ativan<sup>md</sup>) à 0,5 mg. Si usager âgé entre 70 et 85 ans **et** si son poids corporel actuel inférieur à 45 kg, diminuer la dose de Lorazépam (Ativan<sup>md</sup>) à 0,25 mg.

3. **Administrer :**

 œil : droit  gauche 

**Simultanément** (c'est-à-dire, administrer 1 goutte de chaque agent dans l'œil à opérer, un à la suite de l'autre. Attendre 5 minutes, puis recommencer, pour un total de trois fois) :

- Cyclopentolate (Cyclogyl<sup>md</sup>) 1 %, 1 goutte q 5 min. X 3, débiter 1 heure préopératoire (format « minims »);
- Phényléphrine (Mydrin<sup>md</sup>) 2,5 %, 1 goutte q 5 min. X 3, débiter 1 heure préopératoire (format « minims »);
- Moxifloxacine (Vigamox<sup>md</sup>) 0,5 %, 1 goutte q 5 min. X 3, débiter 1 heure préopératoire (bouteille en format de 3 ml).

**Ordonnance collective :**

Administration de la médication préopératoire pour une chirurgie ophtalmique.

**Numéro**

Ophthalmologie-01

**RÉFÉRENCES :**

- ANONYME, *Antimicrobial prophylaxis for surgery*, Treat Guidel Med Lett 2006; 4 (52) : 83-88.
- ASSOCIATION DES PHARMACIENS DU CANADA, *Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques*, Toronto, Webcom Limitée, 2007.
- LEWIS, S. M., M. M. HEITKEMPER et S. DIRKSEN, *Soins infirmiers médecine-chirurgie*, Laval : Beauchemin, 2003, vol. 4.
- SMELTZER S. C. et B. G. BARE, *Médecine et Chirurgie*, 4<sup>e</sup> éd. Saint-Laurent, ERPI, 2006, vol. 6.

**ÉLABORÉE PAR :**

- Ginette Provost, conseillère clinicienne par intérim au programme clientèle de chirurgie
- Johanne Lapré, conseillère clinicienne au programme clientèle de chirurgie
- Joanne Mathieu, AIC à la clinique préparatoire à la chirurgie et chirurgie d'un jour à l'Hôtel-Dieu
- D<sup>r</sup> Pierre Blondeau, chef du service d'ophtalmologie
- Pierre Madore/Marie-Claude Fortin, pharmaciens

