

ORDONNANCE COLLECTIVE

ORDONNANCE COLLECTIVE : Initiation du traitement correctif d'une hypoglycémie chez un patient connu diabétique adulte et pédiatrique		NUMÉRO : Transversal-01
DESCRIPTION : Corriger une hypoglycémie suite à l'analyse des résultats de la glycémie capillaire obtenue chez un patient connu diabétique symptomatique ou non.	DATE DE MISE EN VIGUEUR :	DATE DE RÉVISION :
TITRE DU PROTOCOLE : Initiation du traitement correctif d'une hypoglycémie chez un patient connu diabétique		
ACTIVITÉS RÉSERVÉES : <ul style="list-style-type: none">• Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique;• Initier des mesures thérapeutiques, selon une ordonnance;• Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé présente des risques, incluant le monitoring et les ajustements du plan thérapeutique infirmier;• Administrer et ajuster des médicaments et d'autres substances lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.		
PROFESSIONNELS HABILITÉS À EXÉCUTER L'ORDONNANCE : Les infirmiers(ères) du CHUS ayant reçu la formation appropriée.		

ORDONNANCE COLLECTIVE :

Initiation du traitement correctif d'une hypoglycémie chez un patient connu diabétique adulte et pédiatrique

NUMÉRO :

Transversal-01

INDICATIONS ET CONDITIONS D'INITIATION :**Patient connu diabétique présentant :**

- Des signes et symptômes autonomes d'hypoglycémie et/ou une glycémie <4 mmol/L:
 - Tremblement
 - Sueurs froides
 - Fringale (faim)
 - Pâleur
 - Faiblesse générale
 - palpitation
- Des signes et symptômes neuroglucopéniques d'hypoglycémie et/ou une glycémie <4 mmol/L:
 - Céphalée
 - Paresthésie
 - Parésie
 - Étourdissement
 - Engourdissement

CONTRE-INDICATIONS/LIMITES :

- Clientèle non-connue diabétique
- Clientèle de chirurgie bariatrique
- Client présentant une altération de l'état de conscience (confusion, coma)
- Client présentant une difficulté de déglutition (dysphagie)
- Clientèle sous diète NPO
- Clientèle sous gavage ou HAIV
- Clientèle néonatale et nouveaux-nés de la maternité

ORDONNANCE COLLECTIVE :

Initiation du traitement correctif d'une hypoglycémie chez un patient connu diabétique adulte et pédiatrique

NUMÉRO :

Transversal-01

INTENTION THÉRAPEUTIQUE OU BUT VISÉ :

- Prévenir ou réduire l'évolution des complications, à court terme relié à une hypoglycémie, en corrigeant l'hypoglycémie par un apport suffisant en glucides.

<p>ORDONNANCE COLLECTIVE :</p> <p>Initiation du traitement correctif d'une hypoglycémie chez un patient connu diabétique adulte et pédiatrique</p>	<p>NUMÉRO :</p> <p>Transversal-01</p>
<p>PROTOCOLE :</p>	
<p>TITRE : Initiation du traitement correctif d'une hypoglycémie chez un patient diabétique</p>	
<p>Procédure :</p> <p>Lors du dépistage d'une hypoglycémie, l'infirmière doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suivre l'algorithme pour correction d'une hypoglycémie (Annexe A) • Documenter l'utilisation de l'ordonnance collective de la façon suivante : <ul style="list-style-type: none"> ○ Dans Ariane : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Documenter l'administration du produit via l'onglet glycémie capillaire (insuline/collation/hypo) ○ Dans les commentaires (Ariane) ou dans la note d'observation infirmière : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inscrire les éléments d'évaluation justifiant l'utilisation de l'ordonnance collective, les interventions posées, les réactions du patient. <p>Principes généraux pour la correction de l'hypoglycémie:</p> <p>En tout temps, l'infirmière doit communiquer avec le médecin responsable ou le médecin traitant pour tout résultat < 2,5 mmol/L ou lorsqu'elle juge que ses compétences ne lui permettent pas de corriger l'hypoglycémie ou lors de situations non prévues par l'ordonnance collective. Pour la correction d'une hypoglycémie, il est important de corriger avec l'apport recommandé en glucides.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un apport en glucides inférieur aux recommandations ne permettra pas de corriger l'hypoglycémie, ce qui peut représenter un risque de complication à court terme pour le patient. • Un apport en glucides supérieur aux recommandations pourra provoquer un déséquilibre des tendances glycémiques chez le patient, pouvant même mener à des hyperglycémies <p>RÉFÉRENCES :</p> <p>Association Canadienne du diabète- ACD (2013). Lignes directrices de pratique clinique de l'ACD pour la prévention et le traitement du diabète au Canada.</p>	

ÉLABORÉE PAR :

Frédéric Grondin, Inf. M.Sc., conseiller cadre clinicien, programme clientèle soins médicaux spécialisés

Geneviève Paquette, Inf. M.Sc., conseillère cadre clinicienne, programme mère-enfant

Martine Proulx, Inf. M.Sc., conseillère cadre clinicienne

Nicole Van Rossum, M.D., Service d'endocrinologie

Judith Simoneau-Roy, M.D., Service d'endocrinologie pédiatrique

Basé sur les travaux de : Pierre Madore, Pharmacien, Marie-France Langlois, M.D., Service d'endocrinologie, Nancy Gagné, M.D., Service d'endocrinologie pédiatrique, Équipe du centre de jour du diabète de l'Estrie

VALIDÉ PAR :


APPROBATION :


Médecin, chef du département clinique, Pédiatrie


11 août 2015
Date


Chef du département de pharmacie (si utilisation de médicaments)


6 Août 2015
Date


Médecin, chef du département clinique, médecine spécialisée

14/08/2015
Date


Direction des soins infirmiers / Direction services professionnels

19/08/2015
Date


Président du CMDP

08/09/2015
Date

DATE PRÉVUE DE RÉVISION

Algorithme pour correction d'une hypoglycémie Chez la clientèle connue diabétique adulte et pédiatrique

*** Alerte * Ne pas appliquer le protocole et aviser le médecin si :**

- Altération de l'état de conscience (confusion, coma)
- Clientèle non connue diabétique
- Diète NPO
- Clientèle de chirurgie bariatrique
- Gavage ou HAIV
- Difficulté de déglutition
- Clientèle néonatale et nouveaux-nés de la maternité

Signes et symptômes d'hypoglycémie

1- Autonomes:

- Tremblement
- Sueurs froides
- Fringale (faim)
- Faiblesse générale

2- Neuroglucopéniques:

- Palpitation
- Pâleur
- Symptômes neurologiques (céphalée, paresthésie, parésie, étourdissement, engourdissement)

