

ORDONNANCE COLLECTIVE

NOM DE L'ORDONNANCE COLLECTIVE : Prélèvement toxine du C. difficile		NUMÉRO : OC : PCI-04
INSTALLATION(S) / CENTRES D'ACTIVITÉS CONCERNÉE(S) : Tout le CSSS La Pommeraie		MISE EN VIGUEUR LE : Juillet 2008
		RÉVISÉE LE : Nouvelle OC
PROTOCOLE ASSOCIÉ : <input checked="" type="checkbox"/> OUI (intégré) <input type="checkbox"/> NON	ORDONNANCE PERMANENTE OU COLLECTIVE REMPLACÉE : AUCUNE	
ACTIVITÉ(S) RÉSERVÉE(S) : Infirmières : <ul style="list-style-type: none">- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques		
PROFESSIONNEL(S) HABILITÉ(S) : Infirmières du CSSS La Pommeraie		
SITUATION CLINIQUE VISÉE OU GROUPE DE CLIENTS VISÉS : Usager à risque de diarrhée associée au c. difficile (DACD) présentant de la diarrhée		
BUT THÉRAPEUTIQUE : Diagnostiquer précocement la DACD pour permettre : <ul style="list-style-type: none">• un traitement rapide de l'épisode• d'éviter les complications• de prévenir une éclosion		
INDICATIONS DES CIRCONSTANCES DÉCLENCHANT L'EXÉCUTION DE L'ORDONNANCE : Dès la présence de diarrhée* chez un usager identifié à risque sur le FADM ¹ ou chez un usager qui présente un des facteurs de risques suivants : <ul style="list-style-type: none">• Prise d'antibiotiques dans les derniers 3 mois• Antécédent de DACD• Âgé de plus de 65 ans• Immunosupprimé, sous chimiothérapie ou dénutri• Prise d'un inhibiteur de la pompe à proton (ex. : pantoloc, prevacid, losec, etc.) ou de laxatifs• Présente plusieurs comorbidités *Diarrhée : 3 selles liquides ou molles au cours d'une période de 24 heures		

1. Feuille d'administration des médicaments.

CONTRE-INDICATIONS CLINIQUES :

Pas d'indication de prélèvement en cours ou à la fin d'un traitement d'une DACD

PROTOCOLE :

- 1) Identification des usagers à risque par le pharmacien via la feuille d'administration des médicaments (FADM)
- 2) Utilisation de la feuille de décompte des selles chez les usagers à risque de DACD
- 3) Faire un prélèvement de la toxine du C. Difficile pour tout usager à risque présentant de la diarrhée
- 4) L'usager est mis en isolement en attendant le résultat du test
- 5) Aviser le médecin si la recherche de toxine s'avère positive

Dernière mise en pages : 2010-09-20 (enlevé inf. aux. et ajouté une activité réservée)

Emplacement : U:\RP\Pharmacie et Secrétaires\ABRÉVIATIONS DANGEREUSES DANS OC ET P\Pour double-vérification\OC PCI-04 Prélèvement C difficile.doc

Signatures : (Représentants des groupes consultés)

Originale signée

Dr Michel Camirand
Chef du département de médecine générale

Date

Originale signée

Mme France St-Pierre
Chef du département de pharmacie

Date

Dre Katherine O'Sullivan
Chef du département de chirurgie

Date

Originale signée

Mme Louise Favreau
Directrice des soins infirmiers

Date

Originale signée

Dr Christian Léger
Directeur des affaires médicales et services prof.

Date

Recommandation d'acceptation :

Originale signée

Président du CMDP

2008-07-02

Date

Approbation :

Comité de direction

2008-07-02

Date